

新薬価基準収載品目

(株)ほくやく D I 室
Tel. 011(611)1099

2019年5月21日 官報告示(5月22日適用)

分類	メーカー	商品名	成分名	規格	薬価(円)	効能・効果	用法・用量	包装	発売日
瘍 その 他の 腫	ヤンセンフ アーマ	アーリーダ錠 60 mg [劇] [処] [874291] 4291059F1029	アパルタミド	60 mg 1 錠	2,281.90	《前立腺癌治療剤》 遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌	成人： 1日1回240mgを経口投与。 患者の状態により適宜減量。	PTP 56T	5月30日
医 薬 品	アステラス 製薬	スマイラフ錠 50 mg [劇] [処] [873999] 3999046F1023	ペフィシチニ ブ臭化水素酸 塩	50 mg 1 錠	1,741.00	《ヤヌスキナーゼ (JAK) 阻 害剤》 既存治療で効果不十分な関節リウマチ (関節の構造的損傷の防止を含む)	成人： 150mgを1日1回食後に経口投与。患者の状態に応じて100mgを1日1回投与できる。	PTP 14T	7月10日
		スマイラフ錠 100 mg [劇] [処] [873999] 3999046F2020		100 mg 1 錠					
精 神 神 経 用 剤	塩野義製薬	ビバンセカプセル 20 mg [劇] [覚] [処] [871179] 1179059M1024	リスデキサン フェタミンメ シル酸塩	20 mg 1 カプセル	674.80	《中枢神経刺激剤》 小児期における注意欠陥/ 多動性障害 (AD/HD)	小児： 30 mgを1日1回朝経口投与。症状により、1日70mgを超えない範囲で適宜増減、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として20mgを超えない範囲で行う。	PTP 30P	未定
		ビバンセカプセル 30 mg [劇] [覚] [処] [871179] 1179059M2020		30 mg 1 カプセル					
高 脂 血 症 用 剤	MSD = バ イエル薬品	ロソーゼット配合錠 LD [処] [872189] 2189102F1024	エゼチミブ/ ロスバスタチ ンカルシウム	1 錠	177.00	《小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/ HMG-CoA 還元酵素阻害剤配合剤》 高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症	成人： 1日1回1錠を食後に経口投与。	PTP 100T	5月28日
		ロソーゼット配合錠 HD [処] [872189] 2189102F2020		1 錠					

* 商品名欄記載事項

[規制区分]、[日本標準商品分類番号]、薬価基準収載医薬品コード(厚生省コード)：英数12桁
[処]：処方箋医薬品…医師等の処方箋により使用すること。 発売日：前後する場合もあり。

参考資料：薬事・食品衛生審議会 薬事分科会資料
製品添付文書 他

新薬価基準収載品目

(株)ほくやく D I 室
Tel. 011(611)1099

2019年5月21日 官報告示(5月22日適用)

分類	メーカー	商品名	成分名	規格	薬価(円)	効能・効果	用法・用量	包装	発売日
無機質製剤	藤本製薬	アセレント注 100 µg [劇] [処] [87322] 3229402A1023	亜セレン酸ナトリウム	100 µg 2mL 1 瓶	1,618	《低セレン血症治療剤》 低セレン血症	成人及び12歳以上の小児： 1日100 µgを開始用量とし、高カロリー輸液等に添加し、中心静脈内に点滴静注。以後、患者の状態により1日50～200 µgの間で適宜用量を調整するが、効果不十分な場合には1日300 µgまで中心静脈内に点滴静注することができる。 12歳未満の小児： 1日2 µg/kg(体重50 kg以上の場合は100 µg)を開始用量とし、高カロリー輸液等に添加し、中心静脈内に点滴静注。以後は、患者の状態により1日1～4 µg/kg(体重50 kg以上の場合は50～200 µg)の間で適宜用量を調整し中心静脈内に点滴静注。 1日投与量を1日1回末梢静脈内に点滴静注又は緩徐に静脈内注射することもできる。	2mL×10V	6月6日
他に分類されない代謝性医薬品	アッヴィ	スキリージ皮下注 75 mgシリンジ 0.83mL [生] [劇] [処] [873999] 3999450G1028	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	75 mg 0.83mL 1 筒	239,374	《ヒト化抗ヒト IL-23p19 モノクローナル抗体製剤》 既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	成人： 1回150 mgを初回、4週後、以降12週間隔で皮下投与。 患者の状態に応じて1回75 mgを投与することができる。	1 筒 2 筒	5月24日

***商品名欄記載事項**

[規制区分]、[日本標準商品分類番号]、薬価基準収載医薬品コード(厚生省コード)：英数12桁
[処]：処方箋医薬品…医師等の処方箋により使用すること。 発売日：前後する場合もあり。

参考資料：薬事・食品衛生審議会 薬事分科会資料
製品添付文書 他

新薬価基準収載品目

2019年5月21日 官報告示（5月22日適用）

(株)ほくやく DI室
Tel. 011(611)1099

分類	メーカー	商品名	成分名	規格	薬価(円)	効能・効果	用法・用量	包装	発売日
血液製剤類	CSL ベーリン グ	ピリヴィジェン 10%点滴静注 5g/50mL [特] [処] [876343] 6343427A7020	pH4 処理酸性人免疫グロブリン	5g50mL1 瓶	39,718	≪血漿分画製剤(液状静注用 人免疫グロブリン製剤)≫ ①慢性炎症性脱髄性多発根 神経炎の筋力低下の改善 ②慢性炎症性脱髄性多発根 神経炎の運動機能低下の進 行抑制(筋力低下の改善が認 められた場合)	成人： ①1日に400mg(4mL)/kg 体重を5日間連日点滴静 注。 ②「1,000mg(10mL)/kg体 重を1日」又は「500mg (5mL)/kg体重を2日間連 日」を3週間隔で点滴静注。	1V	8月19日
		ピリヴィジェン 10%点滴静注 10g/100mL [特] [処] [876343] 6343427A8026		10g100mL1 瓶	78,580			1V	
		ピリヴィジェン 10%点滴静注 20g/200mL [特] [処] [876343] 6343427A9022		20g200mL1 瓶	155,468			1V	
ワクチン類	グラクソ・ス ミスクライ ン	ラビピュール筋注用 [生] [劇] [処] [876313] 6313400E1025	不活化狂犬病 ウイルス (Flury LEP株)	1 瓶 (溶解液付)	11,867	≪乾燥組織培養不活化狂犬 病ワクチン≫ 狂犬病の予防及び発病阻止 ※保険適応となるのは発病 阻止のみ	添付の溶剤(日本薬局方注 射用水)の全量で溶解し、 次のとおり使用。 1. 曝露前免疫 1.0mLを1回量として、適 切な間隔をおいて3回筋肉 内に接種。 2. 曝露後免疫 1.0mLを1回量として、適 切な間隔をおいて4~6回 筋肉内に接種。	1 回分：1V(溶剤 1mL：1本添付)	7月26日
アルキル化剤	大日本住友 製薬	リサイオ点滴静注液 100mg [劇] [処] [874212] 4212400A1021	チオテパ	100mg 2.5mL 1 瓶	189,816	≪造血幹細胞移植前治療薬 ≫ 小児悪性固形腫瘍における 自家造血幹細胞移植の前治 療	メルファランとの併用に おいて、1日1回200mg/ m ² を24時間かけて点滴静 注。これを2日間連続で行 い、5日間休薬した後、さ らに同用量を2日間連続で 行う。患者の状態により適 宜減量。	1V	5月28日

*商品名欄記載事項

[規制区分]、[日本標準商品分類番号]、薬価基準収載医薬品コード(厚生省コード)：英数12桁
[処]：処方箋医薬品…医師等の処方箋により使用すること。 発売日：前後する場合もあり。

参考資料：薬事・食品衛生審議会 薬事分科会資料
製品添付文書 他

新薬価基準収載品目

2019年5月21日 官報告示（5月22日適用）

(株)ほくやく DI室
Tel. 011(611)1099

分類	メーカー	商品名	成分名	規格	薬価(円)	効能・効果	用法・用量	包装	発売日
酵素製剤	帝人ファーマ	レブコビ筋注 2.4 mg [処] [873959] 3959421A1023	エラペグアデマーゼ（遺伝子組換え）	2.4 mg 1.5mL 1 瓶	846,349	<p>《ポリエチレングリコール修飾／遺伝子組換えアデノシンデアミナーゼ酵素製剤》</p> <p>アデノシンデアミナーゼ欠損症</p>	0.2 mg/kgを1週間に1回筋肉内注射。患者の状態に応じて適宜増減するが、1回あたりの最大投与量は0.3 mg/kg。速やかにアデノシンデアミナーゼ活性を上昇させる必要がある場合、1回0.2 mg/kgを1週間に2回筋肉内注射することができる。	1V	5月29日
その他の呼吸器官用薬	グラクソ・スミスクライン	テリルジー100エリプタ 14 吸入用 [処] [87229] 2290804G1022	フルチカゾンフランカルボン酸エステル／ウメクリジニウム臭化物／ビランテロールトリフェニル酢酸塩	14 吸入 1 キット	4,107.40	<p>《3成分配合 COPD 治療剤》</p> <p>慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β₂刺激剤の併用が必要な場合）</p>	成人： 1吸入を1日1回吸入投与。	100 エリプタ 14 吸入用×1	5月22日
		30 吸入 1 キット		8,692.80	100 エリプタ 30 吸入用×1				

再生医療等製品については記載しておりません。

*** 商品名欄記載事項**

[規制区分]、[日本標準商品分類番号]、薬価基準収載医薬品コード(厚生省コード)：英数12桁
[処]：処方箋医薬品・・・医師等の処方箋により使用すること。 発売日：前後する場合もあり。

参考資料：薬事・食品衛生審議会 薬事分科会資料
製品添付文書 他